

Исследование случайной величины w_a и ее связи с проблемой делителей Дирихле

Дмитрий Пятин / dmpyatin@petrsu.ru

03.07.2020

Аннотация: В данной работе исследуется дискретная случайная величина w_a :

$$X = \left\{ x_i \mid \frac{a-i}{a} \right\}, \mathbb{P}(w_a = x_i) = \frac{1}{a}, i = 1, \dots, a, a \in \mathbb{N}^*$$

Найдены ее характеристики. Показано, что дисперсия суммы случайных величин:

$$\begin{aligned} \text{Var} \left[\sum_{a=1}^n w_a \right] &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \text{Cov}(w_a, w_b), \\ \text{Cov}(w_a, w_b) &= \frac{\text{gcd}(a, b)^2 - 1}{12ab} \end{aligned} \quad (1)$$

Дана оценка дисперсии:

$$\text{Var} \left[\sum_{a=1}^n w_a \right] = O(n \ln n - n + O(n) - H_n^2) \quad (2)$$

Показано, что при рассмотрении:

$$\left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor = \frac{x}{a} - E[w_a]$$

мы можем получить формулу для подсчета $D(n)$ числа целочисленных точек под гиперболой $\frac{n}{xy}$, $1 \leq x \leq n$, $1 \leq y \leq n$:

$$D(n) = n \ln n + (2\gamma - 1)n + H_{\sqrt{n}} + O(1)$$

со среднеквадратическим отклонением порядка $O\left(\sqrt{\sqrt{n} \ln \sqrt{n} - \sqrt{n} + O(\sqrt{n}) - H_n^2}\right)$ со скрытой константой $C = \frac{1}{2\pi^2}$ в главном подкоренном члене. Как следствие, мы можем говорить о оценке: $O(n^{\frac{1}{4}+\epsilon})$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{\sqrt{n} \ln \sqrt{n} + \sqrt{n} - H_n^2}}{n^{\frac{1}{4}+\epsilon}} \right) = 0 \quad (3)$$

для некоторого очень малого ϵ .

1. Случайная величина w_a

Поставим в соответствие каждому числу $a, a \in \mathbb{N}^*$ дискретную случайную величину w_a со множеством значений:

$$X = \left\{ x_i \mid \frac{a-i}{a} \right\}, i = 1, \dots, a \quad (4)$$

и вероятностью:

$$\mathbb{P}(w_a = x_i) = \frac{1}{a} \quad (5)$$

Математическое ожидание данной случайной величины равняется:

$$E[w_a] = \sum_{i=1}^a \left(\frac{1}{a} \cdot \frac{(a-i)}{a} \right) = \frac{a-1}{2a} \quad (6)$$

Дисперсия:

$$\text{Var}[w_a] = \sum_{i=1}^a \left(\frac{1}{a} \cdot \left(\frac{(a-i)}{a} - \frac{a-1}{2a} \right)^2 \right) = \frac{a^2-1}{12a^2} \quad (7)$$

Среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma[w_a] = \sqrt{\text{Var}[w_a]} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \sqrt{\frac{a^2-1}{a^2}} \quad (8)$$

2. Случайная величина $w(n)$

Рассмотрим случайную величину $w(n) = \sum_{i=1}^n w_i$. Ее матожидание:

$$E[w(n)] = \sum_{i=1..n} E[w_i] = \sum_{i=1..n} \left(\frac{i-1}{2i} \right) = \frac{1}{2}(n - H_n) \quad (9)$$

Дисперсия:

$$\text{Var}[w(n)] = \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \text{Cov}(w_a, w_b) \quad (10)$$

где ковариация:

$$\text{Cov}(w_a, w_b) = \quad (11)$$

$$= \frac{1}{\text{lcm}(a, b)} \sum_{i=1}^{\frac{a}{\text{gcd}(a, b)}} \sum_{j=1}^{\frac{b}{\text{gcd}(a, b)}} \sum_{k=1}^{\text{gcd}(a, b)} \left(\left(\frac{a - ((i-1)\text{gcd}(a, b) + k)}{a} - \frac{a-1}{2a} \right) \left(\frac{b - ((j-1)\text{gcd}(a, b) + k)}{b} - \frac{b-1}{2b} \right) \right) = \quad (12)$$

$$= \frac{\text{gcd}(a, b)^2 - 1}{12 \text{lcm}(a, b) \text{gcd}(a, b)} = \frac{\text{gcd}(a, b)^2 - 1}{12ab} \quad (13)$$

Формула (11) описывает ковариационную матрицу $A(d_1, d_2)$ блочной структуры:

$$A\left(\frac{a}{\gcd(a,b)}, \frac{b}{\gcd(a,b)}\right) = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \\ G_{\frac{a}{\gcd(a,b)}, 1} & & G_{\frac{a}{\gcd(a,b)}, \frac{b}{\gcd(a,b)}} \end{bmatrix} \quad (14)$$

где $G(d_1, d_2)$ диагональная матрица:

$$G(\gcd(a,b), \gcd(a,b)) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\text{lcm}(a,b)} & 0 & \cdots \\ \vdots & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{\text{lcm}(a,b)} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Перепроверить формулу (11) можно в Wolfram Alpha по ссылке [2].

Дадим оценку дисперсии:

$$\text{Var}[w(n)] = \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \frac{\gcd(a,b)^2 - 1}{12ab} = \quad (16)$$

$$= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \frac{\gcd(a,b)^2}{12ab} - \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \frac{1}{12ab} = \frac{1}{12} \left(\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \frac{\gcd(a,b)^2}{ab} - H_n^2 \right) \quad (17)$$

Нас интересует главный член:

$$\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \frac{\gcd(a,b)^2}{ab} \quad (18)$$

Перепишем его:

$$\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \frac{\gcd(a,b)^2}{ab} = 2 \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^{a-1} \frac{\gcd(a,b)^2}{ab} + n \quad (19)$$

У меня не получилось найти какое-либо упрощение для сумм с двумя \gcd множителями. Поэтому тут дадим грубую оценку, используя только один \gcd множитель:

$$\frac{\gcd(a,b)^2}{ab} \leq \frac{\gcd(a,b)}{a}, \quad \forall b < a \quad (20)$$

и будем далее рассматривать сумму:

$$\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^{a-1} \frac{\gcd(a,b)}{a} = \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^a \frac{\gcd(a,b)}{a} - n \quad (21)$$

Известно (см. [1]), что:

$$P(a) = \sum_{b=1}^a \gcd(a,b) = \sum_{d|a} d \phi\left(\left\lfloor \frac{a}{d} \right\rfloor\right) \quad (22)$$

$$A(a) = \frac{P(a)}{a} = \sum_{b=1}^a \frac{\gcd(a,b)}{a} = \sum_{d|a} \frac{\phi(d)}{d}$$

Также известно (см. [1]), что:

$$\sum_{a=1}^n A(a) = \frac{1}{2\zeta(2)} n \ln n + O(n) \quad (23)$$

Из обратной подстановки (23), (21), (19) и (16) вытекает оценка дисперсии:

$$\sigma \left[\sum_{i=1}^n w_i \right] = \sqrt{\text{Var} \left[\sum_{i=1}^n w_i \right]} = O \left(\sqrt{\frac{1}{12} \left(\frac{1}{\zeta(2)} n \ln n - H_n^2 - n + O(n) \right)} \right) \quad (24)$$

Отметим, что скрытая константа в главном члене равна:

$$C = \frac{1}{12\zeta(2)} = \frac{1}{2\pi^2}. \quad (25)$$

3. Формула для $D(n)$

Применим описанные выше свойства случайной величины w_a . Представим формулу для нахождения $D(n)$ – числа целочисленных точек (x, y) под гиперболой $\frac{n}{xy}$, таких, что $1 \leq x \leq n$, $1 \leq y \leq n$.

Пусть:

$$\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = \frac{n}{x} - \mathbb{E}[w_x] \quad (26)$$

и пусть:

$$\Delta = \sum_{x=1.. \sqrt{n}} \mathbb{E}[w_x] = \sum_{x=1.. \sqrt{n}} \frac{x-1}{2x} = \frac{1}{2} (\sqrt{n} - H_{\sqrt{n}}) \quad (27)$$

также, пусть:

$$\sum_{x=1.. \sqrt{n}} \left(\frac{n}{x} - \left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor \right) = nH_{\sqrt{n}} - \Delta \quad (28)$$

Тогда, применив комбинаторные рассуждения, получим:

$$D(n) = 2 \left(nH_{\sqrt{n}} - \Delta - \frac{\sqrt{n}^2}{2} \right) = 2 (nH_{\sqrt{n}} - \Delta) - n \quad (29)$$

откуда:

$$\begin{aligned} D(n) &= 2nH_{\sqrt{n}} - 2\Delta - n = \\ &= 2n \left(\ln \sqrt{n} + \gamma + \frac{1}{2\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) - 2 \left(\frac{1}{2} (\sqrt{n} - H_{\sqrt{n}}) \right) - n = \\ &= n \ln n + 2\gamma n - n + \sqrt{n} - \sqrt{n} + H_{\sqrt{n}} + O(1) = \\ &= n \ln n + (2\gamma - 1)n + H_{\sqrt{n}} + O(1) \end{aligned} \quad (30)$$

или в более точном виде:

$$D(n) = (2n + 1)H_{\sqrt{n}} - n - \sqrt{n} \quad (31)$$

Согласно (24), равенства (29), (30), (31) выполняются выполняется со среднеквадратическим отклонением порядка $O\left(\sqrt{\sqrt{n} \ln \sqrt{n} + \sqrt{n} - H_n^2}\right)$ с малой скрытой константой (25).

Важно заметить, что в (29) используется \sqrt{n}^2 , а не $\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2$ т.к. мы используем суммирование гармоник от 1 до \sqrt{n} *включительно*.

Аналогичный результат можно получить, используя данные рассуждения в методе гиперболы Дирихле. Обозначим вспомогательно:

$$\Delta_* = \mathbb{E}[w_{\sqrt{n}}] = \frac{\sqrt{n} - 1}{2\sqrt{n}} \quad (32)$$

тогда:

$$D(n) = S_1(n) + S_2(n) = \sum_{x \leq \sqrt{n}} \sum_{xy \leq n} 1 + \sum_{\sqrt{n} < x \leq n} \sum_{xy \leq n} 1 \quad (33)$$

где первая сумма равняется:

$$\begin{aligned} S_1(n) &= \sum_{x \leq \sqrt{n}} \sum_{xy \leq n} 1 = \sum_{x \leq \sqrt{n}} \left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = \sum_{x \leq \sqrt{n}} \left(\frac{n}{x} - \mathbb{E}[w_x] \right) = \\ &= \sum_{x \leq \sqrt{n}} \frac{n}{x} - \sum_{x \leq \sqrt{n}} \mathbb{E}[w_x] = nH_{\sqrt{n}} - \Delta \end{aligned} \quad (34)$$

вторая сумма равняется:

$$\begin{aligned} S_2(n) &= \sum_{\sqrt{n} < x \leq n} \sum_{xy \leq n} 1 = \sum_{y \leq \sqrt{n}} \sum_{xy \leq n} 1 - \sum_{y \leq \sqrt{n}} \sum_{x \leq \sqrt{n}} 1 = \sum_{y \leq \sqrt{n}} \left\lfloor \frac{n}{y} \right\rfloor - \left(\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 + 2\sqrt{n}\Delta_* \right) = \\ &= \sum_{y \leq \sqrt{n}} \left(\frac{n}{y} - \mathbb{E}[w_y] \right) - \left(\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 + 2\sqrt{n}\Delta_* \right) = \\ &= \sum_{y \leq \sqrt{n}} \frac{n}{y} - \sum_{y \leq \sqrt{n}} \mathbb{E}[w_y] - \left(\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 + 2\sqrt{n}\Delta_* \right) = \\ &= nH_{\sqrt{n}} - \Delta - \left(\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 + 2\sqrt{n}\Delta_* \right) \end{aligned} \quad (35)$$

суммируя все вместе получаем:

$$D(n) = 2(nH_{\sqrt{n}} - \Delta) - \left(\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 + 2\sqrt{n}\Delta_* \right) \quad (36)$$

рассмотрим $\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2$, т.к.:

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 = (\sqrt{n} - \Delta_*)^2 = n - 2\sqrt{n}\Delta_* + \Delta_*^2 = n - \sqrt{n} + O\left(\frac{1}{n}\right) + 1 \quad (37)$$

то:

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 + 2\sqrt{n}\Delta_* = n - \sqrt{n} + 1 + O\left(\frac{1}{n}\right) + \sqrt{n} - 1 = n + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad (38)$$

таким образом, мы получаем:

$$\begin{aligned} D(n) &= 2(nH_{\sqrt{n}} - \Delta) - n - O\left(\frac{1}{n}\right) = \\ &= n \ln n + (2\gamma - 1)n + H_{\sqrt{n}} + O(1) \end{aligned} \quad (39)$$

как уже было показано в (30). Согласно (24), выражение (39) выполняется со средне-квадратическим отклонением порядка $O\left(\sqrt{\sqrt{n} \ln \sqrt{n} + \sqrt{n} - H_n^2}\right)$ с малой скрытой константой (25).

Список литературы

- [1] Laszlo Toth. A Survey of Gcd-Sum Functions. Journal of Integer Sequences, Vol. 13 2010.
URL: <https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL13/Toth/toth10.pdf>
- [2] Формула для ковариации 9-10-11.
URL: <https://www.wolframalpha.com/input/?i=sum%5Bsum%5Bsum%5B%28%28a+-+%28%28i-1%29+gcd%28a%2Cb%29+%2B+k%29%29%2Fa+-+%28a-1%29%2F%282a%29%29%28%28b+-+%28%28j-1%29+gcd%28a%2Cb%29+%2B+k%29%29%2Fb+-+%28b-1%29%2F%282b%29%29%2Ck%3D1..gcd%28a%2Cb%29%5D%2Cj%3D1..b%2Fgcd%28a%2Cb%29%5D%2Ci%3D1..a%2Fgcd%28a%2Cb%29%5D>